THE RECOVERY KERNEL

მედიკამენტების შეწყვეტის გეგმა: ოპიოიდები.

გამონაყენმა არ არის ის, რაც ადამიანებს კლავს. ის, რაც შემდეგ ხდება, არის ის, რაც მათ სიკვდილს მიუძღვნის.

ეს οბηγε βασίζεται ერთ მნიშვნელოვან განსხვავებაზე, რომელსაც პირველ რიგში უნდა გაითავისოთ, რადგან თუ მას არასწრაფად მიუყოლებთ, ეს სიცოცხლეს უშლის ხელს: ოპიოიდების მოხსნის პროცესი, როგორც წესი, თქვენი სიკვდილამდე არ მიგვიყვანს. ეს არის მთლიანობაში ყველაზე ფიზიკურად უსიამოვნო გამოცდილება, მაგრამ იშვიათად არის ლეტალური თავისით. რაც სიკვდილს ხშირად იწვევს, ის არის შემდეგი: ადრეული დოზის დაბრუნება იმ ორგანიზმში, რომელმაც დაკარგა ტოლერანტობა, რომელიც ჰქონდა მაშინ, როდესაც ეს დოზი ნორმალურადად გრძნობოდა. ეს ერთი ფაქტი ცვლის თითქმენ ყველაფერს ამ სახელმძღვანელს შინაარსში და სწორედ ამიტომ მედიკამენტოზური მკურნალობა (MAT) არის მისი ცენტრალური ნაწილი. მისი ნაცვლად, ცენტრალურ ადგილზე.

0-ე მუხლი — სასწრაფო უსაფრთხოება: გთხოვთ, პირველად ეს წაიკითხოთ.

⚠ სამედიცინო ექსტრემალური შემთხვევა

ოპიოიდების აღდგენის ყველაზე რისკოვანი მომენტი არ არის მოწოვნა. ეს არის იმსჯელეობის განმეორება, შეწყვილის შემდეგ. ადამიანი, რომელიც წყვეტს გამოყენებას და მოგვიანებით επιστρέφει თავის წინასწარ განსაზღვრულ დოზაზე, იღებს მედიკამენტს ისეთი ტოლერანტობით, როდესაც მან არცოდეს გამოიყენა ოპიოიდები, ხოლო ელის იმ ეფექტს, რაც მიიღებოდა რეგულარული გამოყენებისას. ეს არის ოპიოიდების ჭარბი დოზით გარდაცვალების ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, როდესაც უკანონო ნივთიერებები ფართოდ არის დაბინძურებული ფენტანილით - იხილეთ მე-6 თავი.

უგონიერებლად გამოიძახეთ 112 და, თუ ხელმისაწვდომია, გამოიყენეთ ნალოქსონი შემდეგ შემთხვევებში:

- მ ნელი, ზედაპირული ან გაჩერებული სუნთქვა.
- ლურჯი ან ნაცრისფერი ტუჩები ან თითების კონებები.
- უმოქმედობა ან გაღვიძების უნარი.
- რუგბუგუნი ან ხιrιოტი ხმა ყურადღებისმოწადე.

⚠ გაფრთხილება

Naloxone (Narcan) ა neutralizes ოპოიდების გადამეტებულ დოზას და ხელმისაწვდომია რეცეპტის გარეშე ბევრ ფარმაცევტში შეერთებულ შტატებში, ხშირად უფასოდ harm reduction ორგანიზაციების მიერ. მისი ხელმისაწვდომობა – თქვენთვის ან თქვენს ოჯახის ნებისმიერი წევრისთვის, ვისაც აქვს ოპოიდების გამოყენების ისტორია, წარსული თუ ამჟამინდელი – არ არის იმისა დამაბრალებელი ნიშანი. ეს ზუსტად იგივე სახის სიფრთხილეა, რაც ცეცხლის ჩაქრობი: რაღაც, რაც იმედოვნებთ, რომ არასოდეს დასჭირდებათ, მაგრამ მაინც ინახავთ.

▯ თავშესაფარი

ოპიოიდების მოწოვნის ფიზიკური სიმპტომები – რომლებიც აღწერილია მეორე bölümde – მძიმე და ძალიან არასასიამოვნოა, მაგრამ უმეტეს ადამიანს, ვისაც არ აქვს სხვა ciddi ჯანდაცვის პრობლემები, ეს სიმპტომები თავად არ არის სასიკვდილო. სამედიცინო ზედამხედველობა მოწოვნის დროს ძირითადად ის მიზნით ხორციელდება, რომ ტკივილი იყოს საკმარისად შემცირებული, რათა ადამიანი არ დაბრუნდეს ზემოთ აღნიშნულ საშიშ მდგომარეობაში, და არა იმიტომ, რომ მოწოვნა თავად ხშირად საჭიროებს სასწრაფო სამედიცინო ჩარევას. ამ განსხვავების ცოდნა პროცესს არ აუქმნის სირთულეს, მაგრამ ცვლის იმას, რისგან რეალურად უნდა იყოს შიშებული ადამიანი და როდის.

პირველი მუხლი — რატომ არის ეს ინიგება მიზნად ისწრებს, რომ ყურადღება გაამახვილოს MAT-ზე.

ფარმაკოლოგიური მკურნალობა – ბუფრენორფინი, მეთადონი ან ნალტრექსონი – მტკიცებულებათა საფუძველზე არის ყველაზე ეფექტური საშუალება ოპიოიდების გამოყენების დამოკლნებისთვის. ეს ინიგში ნათქვამია, პირდაპირ და რაიმე შეზღუდვის გარეშე: ფარმაკოლოგიური მკურნალობა არ არის დაბალი ხარისხის მკურნალობა, "მუცელი" ან "იგივესთან ბრძოლა". ეს არის სიცოცხლეს გადარჩენის მედიკამენტოზური ჩარევა, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი მონაცემები ლეტალური შემთხვევების შემცირების შესახებ, რაც იშვიათია სხვა დამოკიდებულების მკურნალობაში. ფარმაკოლოგიურ მკურნალობასთან ერთად მიმდინარე მუშაობა – ბიოლოგიური, გარემოებრივი და იდენტობის ასპექტები, რომლებიც აღწერილია 8-ე და 9-ე თავებში – მას გაძლიერებს, არ არის... alternატივა.

THE CENTURION

თუ გითხდით, პროგრამის ან ადამიანის მიერ, რომ MAT (მედიკამენტოზური მკურნალობა) ნიშნავს, რომ "არ ხართ სრულად მოწესრიგებული", ეს შეფასება არ არის დამადასტურებელი მტკიცებებით და იწვევს სიკვდილს. რაც მნიშვნელოვანია, არის გადარჩენა და ფუნქციონირება, არა ის, რომელი კონკრეტული მოლეკულებია ან არ არის ადამიანის ორგანიზმში.

მეორე ნაწილი — მოწოვნის დროშუმა.

დროშუმა.	რა ხდება?	რა უნდა ელით.	რა უნდა გააკეთოთ.
6-24 საათი (დაწყება, რომელიც დამოკიდებულია ოპიოიდების ნახევრად ცხოვრებაზე).	ოპიოიდული რეცეპტორების დაკავება კლებულობს; სისტემა დარჩა ელექტრომომარაგების გარეშე, რაც მოსალოდნელი იყო.	ღელვერა, კუნთების ტკივილი, ოფლიანობა, ღეჭვა, ცხვირიდან სითხის გამონადენი, ადრეული უძილობა.	მეთადონის მკურნალობის დაწყება, თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, ხშირად სწორედ ამ პერიოდში ხდება. კონკრეტულად, ბუპრენორფინის გამოყენებისთვის აუცილებელია, რომ ადამიანი უკვე იყოს მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის მოწოვნის მდგომარეობაში, სანამ მიიღებს პირველ დოზას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული უფრო მწვავე მოწოვნის პროვოცირება.
1-3 დღე (ფიზიკური სიმპტომების მწვერვალი).	მკვეთრი მოწოვნის სინდრომი, ეს არის ყველაზე რთული ფიზიკური პერიოდი.	ღებინება, ღებინება, მოხიბვლა, მუცლის ტკივილი, გაფართოებული გუგული, ცივი შეგრძნება, რომელსაც სვრიტს თან ახლავს, ძლიერი კუნთებისა და ძვლების ტკივილი, უძილობა.	ექიმის ზედამხედველობა ან მედიკამენტოზური მკურნალობა მნიშვნელოვნად ამცირებს სიმძიმე. ეს ასევე არის ყველაზე რისკოვანი პერიოდი, როდესაც ადამიანი წყვეტს, რომ ტკივილი გადაიტანვას და επιστρέφει ნარკოტიკების გამოყენებას, რაც ახლა უკვე საშიში

დროშუმა.	რა ხდება?	რა უნდა ელით.	რა უნდა გააკეთოთ.
			დოზით ხდება - იხილეთ მუხლი 0.
3-10 დღე (ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფსიქოლოგიური სიმპტომების მწვერვალი).	ფიზიკური მოწოვნა განიმტკიცდება; ენდორფინებისა და დოპამინის სისტემები ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა.	ღრმა დეპრესია, ანჰედონია, ემოციური არასტაბილურობა, ძილილევანობა გრძელდება, მუდმივად არსებული სწრაფვა, გარკვეული ფიზიკური სიმპტომები კვლავ გრძნობილია.	საკომპლემენტო საშუალებების სრული ნაკრებული იწყება (მე-9 თავი). დაიწყეთ ვარჯიში რაც შეიძლება მალე, თუნდაც მოკლე ფეხით დაშვებით. ძილის რეგულაცია არის ადრეული რეციდივის თავიდან აცილების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასწარმეტყველებელი — პირველ რიგში მიაწოდეთ მას ყურადღება.
1-4 კვირები.	ენდორფინებისა და დოპამინის სისტემები ნელა ი □□□□□; ოპიოიდული რეცეპტორები იწყებენ გაძლიერებას.	ეტაპობრივი გაუმჯობესება, თუმცა ყოველდღიურად რეალური ცვლილებებია; PAWS-ის ეპიზოდების ალბათობა; ემოციური არასტაბილურობა; მოკლე ხანგრძლივობით, მაგრამ ძლიერი სწრაფვა.	მთლიანი პროტოკოლი ხორციელდება. საზოგადოებასთან კავშირი მნიშვნელოვანია, შესაძლოა, უფრო, ვიდრე ეს გრძნობთ. იზოლაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფაქტორი, რომელიც წინასწარ განსაზღვრავს იმის ალბათობას, რომ ადამიანი დაბრუნდება ნარკოტიკების გამოყენებაზე ამ კონკრეტულ აღდგენის

დროშუმა.	რა ხდება?	რა უნდა ელით.	რა უნდა გააკეთოთ.
			პროცესში.
1-6 თვე.	ზომიერი რეცეპტორების გაძლიერება; დოპამინის და ენდორფინების სისტემები აქტიურად აღადგენს ფუნქციას; ოპიოიდების გამოწვეული ჰიპერალგეზია (გამოწვეული ტკივილის მომატება ოპიოიდების მიერ) იხსნება.	პროგრესული, რეალური გაუმჯობესება; ნამდვილი, ბუნებრივი სიხარულის მომენტების დაბრუნება; ტკივილისადმი მგრძნობელობის ნორმალიზაცია.	აქ მუშაობა მდგრადი ხდება, ვიდრე მხოლოდ გადარჩენის საკითხი. იდენტობის გაუმჯობესების სამუშაო (9-ე განყოფილება) სწორედ აქ არის შესაბამისი, და არა ადრე.
6-18 თვე და მეტი.	მუ-ოპიოიდული რეცეპტორების სიმჭარბე მნიშვნელოვნად აღდგა; ენდორფინის სისტემა ხელახლა იწარმოებს ბუნებრივ კომფორტს და სოციალურ კავშირებს.	ბუნებრივი სიხარული და ურთიერთობა, რომლებიც ხელმისაწვდომია ქიმიური საშუალებების გარეშე; PAWS-ის ეპიზოდები იშვიათად გვხვდება; მსურველობები კონტექსტთან არის დაკავშირებული, ვიდრე მუდმივად არსებობს.	უმეტესობისთვის, эндорფინების სისტემის სრული აღდგენა ხდება 12-18 თვის განმავლობაში, თუ ეს აღდგენა მოიცავს ან არ მოიცავს მედიკამენტოზურ მკურნალობას (MAT).

მესამე ნაწილი — რამდენ ხანს გრძელდება ტვინის აღდგენა?

უმეტეს ადამიანებში, ოპიოიდული რეცეპტორების სრული აღდგენა გრძელდება 12-18 თვე, რაც შეესაბამება სხვა ნივთიერებებს, რომლებსაც უფრო ხანგრძლივი გამოჯვარედინება ესაჭიროება. პოსტ-აკუტური დეზინტოქსიკაციის სინდრომი (PAWS) შეიძლება გრძელდეს 18-24 თვე, ხოლო ფენტანილის გამოყენების შემთხვევაში, ეს ვადები შესაძლოა უფრო მეტი იყოს, იმის გათვალისწინებით, რომ ფენტანილს აქვს განსაკუთრებული რეცეპტორებთან კავშირების უნარი, რაც მას სხვა ოპიოიდებისგან გამოარჩევა.

 მოსმენა.

თუ რვა თვის შემდეგაც გრძნობთ PAWS-ის სიმპტომებს – მოულოდნელ შფოთვას, სწრაფვას ნებისმიერი მიზეზის გარეშე, ან უმწოვან გუნდს დღეების განმავლობაში – ეს არ არის იმის მტკიცება, რომ თქვენი ძალისხმევა ეფექტური არ არის. ეს ზუსტად ის ეტაპია, რომელიც რეალურ დროში იგეგმება. აქ ფინიშ ხაზი წლის მეტი

ხანგრძლივობით გონივდება, და ეს წინასწარ ცოდნა უნდა შეცვალოს რთული მერვე თვის განცდა, არა ის, რომ ეს რთული თვე საერთოდ გაქრეს.

IV. თქვენი გამოცდილება, რომელსაც სავარაუდოდ განიცდით.

- პროცესის დასაწყლის შვებულებებში გამოვლინდა კონკრეტული და ღრმა ანჰედონია – საკვები, მუსიკა და თქვენთვის საყვარელი ადამიანები აღიქმება გულგრილად, რადგან ენდორფინებისა და დოპამინის სისტემები, რომლებიც ოპიოიდებით არის დაბლოკილი, რეალურ ბიოლოგიურ ნულოვან დონეზეა.
- გაძლიერებული ტკივილის მგრძნობელობა (ოპიოიდების გამოწვეული ჰიპერალგიზაცია) – რეალური და დადასტურებული ფენომენი, რომლის დროს ნერვული სისტემა ხანობრივად იზრდება ტკივილზე მგრძნობელობა, ვიდრე იყო ოპიოიდების გამოყენებამდე. ეს მდგომარეობა განიკურნება 2-ე და 3-ე განყოფილებაში აღნიშნულ დროში, თუმცა ის არასასიამოვნოა იმ დროს, როდესაც ხდება.
- ძილი, რომელსაც genuinely-ს těžად აღადგენთ, ხშირად არის იმის ერთ-ერთი მთავარი წინასწარმეტყველებელი, თუ ადრეულ ეტაპზე მოხდება შეცდომა. ამიტომ, მას ისევე სერიოზულად უნდა მიუდგეთ, როგორც ნებისმიერ სხვა აღდგენის ასპექტს.
- მოთხოვნები, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას ნებისმიერი აშკარა მიზეზის გარეშე, განსაკუთრებით PAWS-ის ტალღების დროს – ეს არის ნევრობიოლოგიური პროცესი, არა ნაკლებობის სიმბოლო.
- G-ალელის მატარებლებს შორის გამოხატული სოციალური დისკონექტისა ან მარტოობის გრძნობა (5-ე განყოფილება) — იმავე რეცეპტორი, რომელიც ოპიოიდული მოგებისას მონაწილეობს, ასევე მონაწილეობს ენდორფინებზე დაფუძნებულ სოციალურ კავშირებში, ამიტომ მისი ნაკლებობა შეიძლება გრძნობდეს როგორც თვითონ იზოლაცია, არა მხოლოდ ნარკოტიკის წყურვილი.

მთავარია, გენეტიკური კვლევების შედეგები სხვა კვლევებთან იყოს შეჯერებული.

გენეტიკური კვლევები:
*** MTHFR**
*** COMT**
*** DRD2**

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე findahelpline.com.

[Recovery Kernel]
[Naloxone]

გენი	□ისი კორეგულირება ხდება.	ოპიოიდებისგან გამოჯანმრთელების მნიშვნელობა.
OPRM1 (A118G)	მუ-ოპიოიდული რეცეპტორი – მთავარი რეცეპტორი, რომელზეც ყველა ოპიოიდი მოქმედებს.	ეს არის ამ სახელმძღვანელოში ყველაზე მნიშვნელოვანი გენი. G-ალელის მატარებლებში რეცეპტორების ბმის აფინიტი შეზღუდულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ სტანდარტული დოზებით ნაკლები ტკივილის შემსუბუქება და ნაკლები სასიამოვნო გრძნობები აქვთ, რაც ნაწილობრივ განაპირობებს ემულსიას. იგივე შეზღუდული ბმა ასევე ნიშნავს, რომ მათგან ნაკლები ενδορφίνη-დამოკიდებული სასიამოვნო გრძნობები მიიღება ბუნებრივი წყაროებიდან (სპორტი, ურთიერთობა, სიცილი), ამიტომ ბუნებრივი სასიამოვნების სისტემის დამაკმაყოფილებლად ყოფნა მათთვის უფრო მეტ დროს მოითხოვს. მნიშვნელოვანია: G-ალელის მატარებლებში ნალტრექსონის პასუხი საგრძნობლად უფრო ძლიერია – ეს არის პირდაპირი, სამკურნალო არჩევანის ინფორმაცია, რომელიც უნდა გადაეცეს ექიმს.
CYP2D6	მეტაბოლიზაციას ახორციელებს კოდეინზე,	მწირად მატებულმა ორგანიზმებმა კოდეინიდან ან ტრამადოლიდან

გენი	ისი კორეგულირება ზდება.	ოპიოიდებისგან გამოჯანმრთელების მნიშვნელობა.
	ტრამადოლზე და სხვა მრავალ ოპიოიდებზე, გარდაქმნის მათ აქტიურ ან ინაქტიურ ფორმებად.	თითქმის არ იღებენ სასარგებლოს, რაც მათ აიძულებს დოზის გაზრდას ეფექტის მისაღწევად, რომელსაც ეს კონკრეტული პრეპარატი მათთვის никогда არ მოუტანს. ულტრა-სწრაფად მატებულმა ორგანიზმებმა კოდეინი მორფინში საშიშად სწრაფად გარდაქმნის, რაც არის სიკვდილის დადასტურებული მიზეზი, თუნდაც სტანდარტული, ექიმის მიერ დაწერილი დოზებით. ეს ასევე επηρεάζει ბუპრენორფინის მეტაბოლიზმს, რაც პირდაპირ σχετίζεται με τη δοσολογία της θεραπείας οπιοειδών εξαρτησίας (MAT).
CYP3A4	ფენტანილის, ოქსიკოდონის, მეთადონის და ბუპრენორფინის პირველადი მეტაბოლიზატორი.	მედიკამენტების ფარმაკოკინეტიკური გენის დომინანტობა, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ გამოჯვრევის პროცესში, მოიცავს როგორც პირველადი მეთოქსიკაციისა და მკურნალობის (MAT) საშუალებებს. CYP3A4-ის ინჰიბირება გენეტიკური მიზეზების ან წამლების ურთიერთქმედების გამო (მაგალითად, ზოგიერთი ანტიბიოტიკი, ანტიფუნგალური პრეპარატები, თხილი) შეიძლება გამოიწვიოს ამ მედიკამენტების საშიშ მასიური დაგროვება. CYP3A4-ის ინდუქტორები MAT-ს დეზინტეგრაციას (გამოღმა ხანძრას) შეუძლიათ გამოწვეონ, აფარმკოლოგიურ საშუალებას ძალიან სწრაფად მოცილების გზით. შეატყეთ ყველა ექიმს ყველა პრეპარატი, რომელსაც პაციენტი იღებს.
ABCB1 (P-გლიკოპროტეინი)	სისხლის--ს ბარიერის მედიკამენტების ტრანსპორტი.	გენეტიკური ვარიაციები επηρεάζει το πόσο ოპიოიდი გადადის ტვინში συγκεκριμένη დოზისგან — ზოგიერთი ვარიაცია επιτρέπει μεγαλύτελ , რაც უფრო ισχυρό αποτελέσματα προκαλεί ίδιας δόζας από και πιθανώς επιταχύνει εξάρτησης ανάπτυრას. ასევე επηρεάζει ბუპრენორფინის და მეტადონის კონცენტრაციას ტვინში, რაც σημαντικόა για MAT-ის

გენი	ისი კორეგულირება ხდება.	ოპიოიდებისგან გამოჯანმრთელების მნიშვნელობა.
		ოპტიმიზაციას.
DRD2 (Taq1A, A1 ალელი)	დოპამინის D2 რეცეპტორების სიმჭიდროვე.	A1 გენის მატარებლებს დაახლოებით 30%-ით ნაკლები რეცეპტორების სიმჭიდროვე აქვთ, რაც Reward Deficiency Syndrome-ს (ჯილდოს ნაკლებობის სინდრომს) მიანიშნებს. OPRM1 გენის G-ალელის არსებთან ერთად, ეს იწვევს ჯილდოს სისტემის კომპლექსურ დეფიციტს, რომელიც აფექტს ახდენს როგორც ოპიოიდულ, ასევე დოფამინის ჯილდოს გზებზე – ეს არის ამ სერიაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროფილი.
COMT	დოპამინის გაწმენდის და ტკივილის სიგნალების დამუშავების საკითხები.	ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პირებისთვის, რომელთა ოპიოიდების გამოყენება დაიწყო ლეგიტიმური ტკივილის მკურნალობით. COMT-ს გენეტიკური ვარიაციები მოქმედებს ძირითად ტკივილზე, ανεξάρτητα από την έκθεση σε οπιοειδή, რაც σημαίνει, რომ არასაკმარებლად მკურნალი ტკივილი შეიძლება კვლავ საჭიროებდეს საკუთარ, სპეციალურ მმართველობის გზას (6-ე განყოფილება), მაშინაც კი, როდესაც ოპიოიდების დამოკიდებულება თავად არის მოგვარებული.
MTHFR	მეთილაცია – ნეიროტრანსმიტერების სინთეზი.	დოპამინის და სეროტონინის სინთეზის ძირითადი დეფიციტები, რომლებსაც ოპიოიდებმა შესაძლოა ნაწილობრივ ანაზღაუროდნენ. 5-MTHF-ის გამოყენება ამ აღდგენის საფუძველია და არ არის არასავალდებულო.
GABRA2	GABA-A რეცეპტორის α-2 ქვედანაყოფი – ძირითადი ინჰიბიტორული ტონი.	ეს არ არის მთავარი ოპიოიდული გენი, არამედ ნამდვილი კომპიუნქტორული ფაქტორი ორი მიზეზით: ის იმიტომ, რომ იგივე GABA სტრუქტურა დევს საერთო ოპიოიდებისა და ბენზოდიაზეპინების ან ოპიოიდებისა და ალკოჰოლის ერთდროულ მოხმარებას საფუძველში (თითოეული ნივთიერება გავლენას ახდენს სხვადასხვა რეცეპტორულ სისტემაზე, რათა მოგვარდეს დაკავშირებული შფოთვა/ინჰიბირება), და ის

გენი	ისი კორეგულირება ხდება.	ოპიოიდებისგან გამოჯანმრთელების მნიშვნელობა.
		განსაზღვრავს ქვემოთ აღნიშნულ კონკრეტულ კომბინაციურ პროფილი.

COMT-ს მდგომარეობის გავლენა ოპიოიდების გრძნობებზე.

COMT გავლენას ახდენს დოპამინის და სტრესის ჰორმონების გაწმენდის სიჩქარეზე, ხოლო ეს გაწმენდის სიჩქარე განსაზღვრავს, თუ რა ეფექტი აქვს ობსტანთებს კონკრეტულ ადამიანს. ეს არ მხოლოდ იმას გულისხმობს, რამდენი ობსტანტის გამოყენება ხდება, არამედ რატომ არის საჭირო ამგვარი ეფექტის მიღება.

COMT პროფილი.	ოპიოიდების გამოყენებამდე არსებული მდგომარეობა.	რომელი ოპიოიდებია კონკრეტულად მოწოდებული?
Val/Val ("სამხედრო") - სწრაფი რეაქცია, დაბალი ძირითადი დოპამინის ტონა.	ხშირად არ არის საკმარისად მოტივირებული დასვენების დროს; მიდრეკილია ინტენსივობის და სიახლისკენ, მაშინაც კი, როდესაც არ არის გამოყენებული რაიმე ნივთიერება.	ოპიოიდები სხვა ტიპის relieving-ს უზრუნველყოფენ, ვიდრე სხვა შემთხვევებში: ნაკლებია "გვირკლვად, ბოლოსდაბოლოს" და მეტია "გვირკლვად, საკმარისად კომფორტულად, რომ აღარ იყოს ინტენსიურობის მოწოვნის საჭიროება". ეს პროფილი უფრო ნაკლებად გვხვდება სუფთა ოპიოიდული დამოკიდებულებაში, ვიდრე სტიმულანტების დამოკიდებულებაში, მაგრამ, როდესაც ის არსებობს, აღდგენისთვის აუცილებელია რეალური, მაღალი ინტენსიურობის აქტივობები, არა მხოლოდ სიმშვიდისკენ მიმართული საქმიანობა.
Met/Met ("დამწუხებული" / "მკაცრი") - ნელი გაწმენდა, მაღალი ძირფუძველი სტრესის ქიმიური დონე.	ხშირად უყურადღებო ან გადაღმა რეაგირებს, ისვენების დროსაც კი; ნერვული სისტემა ხშირად არის მომ აქტიური, ακόμη ᴵנפל οποελιმე ნივთიერებასთან დაკავშირებული გავლენის.	ეს არის ოპიოიდებისგან გამოწვეული აღდგენის ყველაზე გავრცელებული პროფილი. ოპიოიდების გავლენით HPA-აქსის დონე ირყევა (5-ე განყოფილებაში მოცემულია გენეტიკური ცხრილი), რაც პირდაპირ ეხმიანება ქრონიკულად გადამეტებულ სტრესულ სისტემას. ეს კომფორტი მხოლოდ ფიზიკურმა არ არის, არამედ პირველადია შემთხვევა, როდესაც უკვე ძალიან აქტიური ნერვული სისტემა იძლება მთლიანად დამშვიდობდეს. სწორედ ამ პროფილიში აღნიშნული HPA-აქსის რეაბილიტაცია ყველაზე ძლიერ

COMT პროფილი.	ოპიოიდების გამოყენებამდე არსებული მდგომარეობა.	რომელი ოპიოიდებია კონკრეტულად მოწოდებული?
		გრძნობდება, რადგან არსებობს უფრო მაღალი საფუძველი, რომლის "გადატვირთვა" ხდება გადამეტებულ მდგომარეობაში.
ჰეტეროზigotური (Val/Met).	ორი ზემოაღნიშნული პროფილიშორის შუალედური საფეხური.	ხშირად ეს არის ნაზავი – ნაწილობრივ ფიზიკური ტკივილის შეს alleviating, ნაწილობრივ კი სტრესის სისტემის relieving, თუმცა არცერთი მათგანი ისე უკიდურესი არ არის, როგორც ჰომოზigotური პროფილიებში.

GABRA2 და "ანქსიოზური დეპრესიული მოდელი".

ეს ღირებულია, რომ პირდაპირ ეწოდოს, ვიდრე GABRA2-ს მცირე შენიშვნად დატოვოთ ზემოთქმულ ცხრილში. თქვენი საკუთარი "გენეტიკური-პროფილირების" სისტემა აკმაყოფილებს კონკრეტულ კომბინაციას – GABRA2-ის მაღალი რისკი, COMT Met/Met – და მას "ანქსიოზურ-დეპრესიულ მოდელს" უწოდებს, რაც მნიშვნელოვანია ალკოჰოლისთვის, ბენზოდიაზეპინებისთვის და ოპიოიდების შემთხვევაში: შეზღუდული თვითშეგვირებულება (COMT) გამდიდრებული ინიბიციური ტონის დარღვევასთან (GABRA2), რაც იწვევს ყველაზე სწრაფად დადასტურებულ პროგრესს დამოკიდებულებისკენ ამ მოდელში.

⚠ გაფრთხილება

თუ ეს კომბინაცია თქვენზე მიუთითებს, ორი რამ არის მნიშვნელოვანი და უნდა იყოს ნათლად ცნობილი. პირველად, სწორედ ამიტომაა პოლიფარმაცეული გამოყენება – ოპიოიდები, ბენზოდიაზეპინები ან ალკოჰოლი – τόσο გავრცელებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში: ოპიოიდი აფრთხობს სტრესის სისტემას და უმშვიდებს ტკივილს, ხოლო GABA-ს გავლენას მ exercise რიგულირующий ნივთიერება ცალსახად მოქმედებს "დაბუზებულ ფრეებზე", და არცერთი მათგანი სრულად არ იფარავს იმას, რაც მეორე κάνει. მეორეა, ეს ნიშნავს, რომ ამ პროფილით ადამიანებისთვის აღდგენა გულისხმობს ორივე სისტემის ერთდროულ მოწესრიგებას – ოპიოიდებზე დაფუძნებულ მუშაობას, რომელიც არის ამ სახელმძღვანელოში, და GABA-ზე დაფუძნებულ მუშაობას, რომელიც περιλαμβάνεται Recovery Kernel-ის ბენზოდიაზეპინების ან ალკოჰოლის გა□□□□ებში, თუ რომელიმე მათგანი გამოიყენება. ასევე, ეს იყო ნაწილობრივი მიდგომა, რომელიც არ ითვალისწინებდა ოპიოიდების დამოკიდებულებას მთლიანობაში.

ფენოტიპირება ტესტების შედეგების გარეშე.

- მომიხდებოდა ტკივილის შემსუბუქება ობსტინატურად, მაშინაც კი, როდესაც სხვა ადამიანებისთვის საკმარისი დოზა იყო? → შესაძლოა, OPRM1 გენის G-ალელი ან ABCB1 ვარიანტი. CYP2D6 ტესტირება მნიშვნელოვანია.

- მომწოვდნენ ოპიოიდები, რომ გრძნობდით თავს ნორმალურად, დაკავშირებულად და კომფორტულად, ისე, როგორც სხვა არაფერმა? → ეს მიანიშნებს OPRM1-ის მაღალ აქტივობაზე და, სავარაუდოდ, ენდორფინების სისტემის დეფიციტზე. სოციალური კავშირების გაძლიერება (9-ე მუხლი) თქვენი აღდგენისთვის არის მთავარი, არა დამხმარე, ელემენტი.
- მომივიდა ტკივილი მკურნალობის გზით? → COMT გენის მუტაციები, რომლებიც ტკივილზე ზემოქმედებს, შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს. არასაკმარებლად მკურნალი ტკივილი მოითხოვს საკუთრივ, პარალელურ მკურნალობას — იხილეთ მე-6 თავი.
- მუდმივად განიცდით შინაგანი სიგრძე ან უსიამოვნებას, ανεξάρτητα από την χρήση οπιοειδών; → სავარაუდოდ, ეს არის DRD2-ის დეფიციტის და MTHFR-ის ჩართულობის შედეგი. დოპამინის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია.

მეხუთე თავი — სპეციალური ჯგუფები

სიტუაცია	￿ოგორ არის განსხვავებული?
ქრონიკული ტკივილი, როგორც შესავლის წერტილი.	მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, ვინც ოპიოიდული დამოკიდებულებიდან გამოწვეულია, გულმოდინებული, ქრონიკული ტკივილი იყო პირველადი მიზეზი და დღემდე რჩება რეალურ, მუდმივ პრობლემად. გენეტიკური წინასწარგანწყობის აღიარება, რომელიც დამოკიდებულებას უდევს საფუძველს, არ ნიშნავს იმას, რომ ტკივილი არ იყო რეალური, და ის არ ქრება ოპიოიდების მოხდავრებთან ერთად. ამ ჯგუფს სჭირდება ტკივილის მმართველობის პროგრამა, რომელიც მიმდევრობით უნდა იყოს აღდგენის პროგრამასთან, და არა მის ნაცვლად – ფიზიკური თერაპია, ოპიოიდების გარეშე ტკივილის მართვა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ბუფრენორფინი, რომელიც სპეციალურად არის დანიშნული ტკივილისთვის (ეს არის ლეგიტიმური, განსხვავებული შემთხვევა მისი გამოყენებისა, რაც შეეხება MAT-ს დამოკიდებულების სამკურნალოდ). კონტროლირებული ტკივილი არის ერთ-ერთი ყველაზე... ამ გაგების მასალაში აღნიშნული არაფრის მიმართ ოპიოიდების გამოყენებისკენ ხელისმომხვეჭველი გზები.
ფენტანილის შემცველი ნივთიერება.	ამჟამინდელი უკანონური ოვოიდების, ასევე, თანდათანობით, უკანონური სტიმულანტებისა და ყალბი პრეპარატების ჯგუფი ხშირად არის დაბინძურებული ფენტანილით, რომელიც წონის მიხედვით მნიშვნელოვნად უფრო ძლიერია, ვიდრე ჰეროინი ან რეცეპტურული ოვოიდები. იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ტოლერანტულობა, რომელიც განუვითარდა ჰეროინის ან პრეპარატების გამოყენების შედეგად, არ აქვს საიმედო დაცვა ფენტანილით დაბინძურებული პარტიისგან – მოქმედების განსხვავება სიკვდილამდე შეიძლება მიგვიყვანოს იმ დოზით, რომელიც უმნიშვნელო იქნებოდა იმ ნივთიერებასთან შედარებით, რომელსაც ისინი ფიქრობდნენ, რომ იყენებდნენ. ფენტანილის ტესტ-სტრები (რომლებიც ხელმისაწვდომია ￿￿￿￿ harm reduction

სიტუაცია	ოგორ არის განსხვავებული?
	ორგანიზაციების მიერ) და ნალოქსონის ხელმისაწვდომობა არ არის არასაჭირო ზომები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამჟამად იყენებენ ოვოიდებს – ეს არის ძირითადი უსაფრთხოების მოწყობილობა, იგივე კატეგორიის. 0-ე განყოფილების სათხოვნა, რომელიც ეხება ცეცხლის შრობას.
შემოწოვნის გზა: მხოლოდ ინტრავენური (IV).	შეიცავს დამატებით რისკებს, რომლებიც დეტალურად აღწერილია Recovery Kernel-ის "ხელები, თვალები და კბილები" სახელმძღვანელოში: ინექციის ადგილზე ინფექცია, ენდოკარდიტი, ჰეპატიტი C და B და ВИЧ. ბაზალური ტესტები სისხლისებრი ინფექციების გამოვლენისთვის არის შესაბამისი სამედიცინო მოვლა აღდგენის ფაზაში, ეს არ არის ბრალდება – და თანამედროვე ჰეპატიტი C-ს მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში ეფექტურია, ανεξάρτητα από το πόσο დიდ χρονικό διάστημα έχει υπάρξει η λοίμωξη.

სუბსტიტუციის და დოზის შემცირების მახასიათებლები.

იმისთვის, ვისაც იცვლება ოპიოიდული მედიკამენტების დოზა, თავად ნივთიერება ცვლის იმ პროცესის ხასიათს. ეს არის ზოგადი მიმოხილვა, არა ინდივიდუალური დოზირების გეგმა – კონკრეტული ციფრები მოითხოვს ექიმს, რომელიც იცის პაციენტის მდგომარეობას, მიმდინარე დოზას და მკურნალობის ხანგრძლივობას. ქვემოთ არის ჩარჩო, რომელსაც ღირს ამ საუბარში შეეხმიანოთ.

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
ფენტანილი	ექსტრემალური	პლასტრიდან დოზის შემცირების

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
(პლასტრი ან	პოტენციალურობა ნიშნავს,	პროცესი, როგორც წესი, ხდება

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

უკანონური	რომ თუნდაც მცირე	მომდევრო ნაკლებ ძლიანობის

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
ფორმით).	პროცენტული შემცირება	მქონე პლასტრით, გაფართოებულ

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	დიდსაბოლოო ცვლილებას	ინტერვალზე (ხშირად ყოველ 2-4

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	წარმოადგენს;	კვირაში), იმავე პროცენტული

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	ტრანსდერმალური	მიდგომის გამოყენებით, რაც

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ფარმაცევტული ფორმის	მთლიანობაში გამოიყენება ამ

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	გამოყენება გულისხმობს □□-ის	სახელმძღვანელოში. ზოგჯერ,

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ცვალებადობას (თბილობა,	პლასტრიდან სხვა პლასტრიმდე

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	კანის მდგომარეობა და	გადასვლის შორის არსებულ

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	პლასტირის განთავსება	ხარვეზს აფარებენ ექიმისგან

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	აფუძნებენ დოზირებას) და ეს	დაწერილი მედიკამენტს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	კიდევ უფრო ზრდის	(ორალური ფორმა). უკონტროლო

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	ფარმაკოლოგიურ ეფექტს.	ფენტანილის დოზის შემცირება

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

		იშვიათად ხდება პირდაპირი

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
		პლასტრიდან სხვა პლასტრიმდე,

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

		როგორც წესი, საჭიროა გარდაქმნა

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
		კონკრეტულ, ექიმის მიერ

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
		დაწერილი ფორმად (იხილეთ MAT,

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
		მუხლი 8).

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
ოქსიკოდონი გვიან	გამოშვების გაწელილი ფორმა	დაბალი დოზის გრადუალური

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
მოქმედების	ნიშნავს, რომ დოზის	შემცირება, როგორც წესი, 10-25%,

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
ფორმით	შემცირებამ იცვლის როგორც	ყოველ 1-4 კვირაში, გამოყენების

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	  * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	  * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	  * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	  * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	  * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	  * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	  * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	  * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

(OxyContin) და სხვა	ეფექტის მწვერვალს, ასევე	ხანგრძლივობისა და სიმძიმის

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
გვიან მოქმედების	მოქმედების ხანგრძლივობას –	შესაბამისად, ზოგჯერ მოკლე

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

ფორმის ოვალური	ისევ შეკვეცა, რომელიც	მოქმედების ფორმულაცია

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
ნარკოტიკები.	ქაღალზე პატარა ჩანს,	ხელმისაწვდომია გამოსვლითი

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	შეიძლება გამოიწვიოს	συμπτώματα გადასვლის დროს. ეს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	დაფარვის "ვაკუუმი", რომელიც	არის ექიმის გადაწყვეტილება,

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ბევრად უფრო დიდია.	თვითონ არ უნდა მიიღოთ ასეთი

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
		გადაწყვეტილებები.

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
ჰიდრომორფონი	მოკლე ნახევრედივირე და	ხშირად გარდაქმნილი

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
(დილაუდიდი)	მორფინისთან შედარებით	(მოგვიანებით მოქმედებადი)

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	მაღალი მოქმედების უნარი	ოპიოიდი ხდება უფრო ხანგრძლივ

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	ნიშნავს, რომ სიმპტომები	მოქმედებასთან, რათა თავად

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	უფრო სწრაფად და	დოზის შემცირების პროცესი იყოს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	ინტენსიურად იჩნდება, ვიდრე	უფრო მოსახერხებელი, ვიდრე

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	გრძელმოვლენიან	მოკლე მოქმედების ფორმის

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ოპიოიდებთან. ეს მსგავსია იმ	პირდაპირი შემცირება. ეს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	პრობლემის, რაც აღწერილია	გარდაქმნა არის რეალური

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	მოკლე ნახევრედივირის	კლინიკური ტექnika და არა რაიმე

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	თვალსაზრისით	ხერხი, და მას უნდა მართობდეს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	ვენლაფაქსინისთვის SSRI/SNRI	ექიმი, გამოთვლილების

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	გა□□ში.	სიმძლავრის გათვალისწინებით.

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
Tapentadoli	ეს არის სხვა მექანიზმით	თუ ტაპენტადოლი არ იყო კარგად

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
(Nucynta)	მოქმედი პრეპარატი, რაც	შესატყვისი, ეს არის ძალიან

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	განსხვავდება ამ ცხრილში	სასარგებლო ინფორმაცია

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	მოცემული სხვა	ექიმისთვის – შესაძლოა, ეს

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	საშუალებებისაგან. ის ორმაგი	მიანიშნებს ორმაგი მოქმედების

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	მოქმედების მატერია: როგორც	მექანიზმზე, ვიდრე ოპიოიდული

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	mu-ოპიოიდული აგონისტი,	დოზის საკუთრივ, და არა იმავე

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ასევე ნორადრენალინის	პრეპარატის სხვა დოზაზე, რაც

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	რეაბსორბციის ინჰიბიტორი. ეს	გულისხმობს სრულიად

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	მეორე მექანიზმი იმას ნიშნავს,	განსხვავებული მედიკამენტის

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	რომ ზოგიერთი ადამიანი	არჩევას.

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ცუდად იტანს მას მიზეზების	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	გამო, რომლებიც არ არის	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	დაკავშირებული ოპიოიდული	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	რეცეპტორებისადმი	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	მგრძნობელობას: დამატებითი	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	როგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	ნორადრენალინის აქტივობა	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	შეიძლება გამოიწვიოს შფოთვა,	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	უძილობა ან გულისმოკლეობა,	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	განსაკუთრებით მათში, ვისაც	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	უკვე აქვთ მაღალი ემოციური	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:
	
	* ფსიქოლოგიური ფაქტორები:
	    * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.
	    * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.
	    * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.
	
	* ფიზიოლოგიური ფაქტორები:
	    * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.
	    * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს.
	
	* სოციალური ფაქტორები:
	    * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.
	    * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.
	    * ეკონომიკ
		ზოგადი მიდგომა

	ფონია (COMT-ის Met/Met	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	**□ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით:** *** ფსიქოლოგიური ფაქტორები:** *** დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები.** *** სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა.** *** დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება.** *** ფიზიოლოგიური ფაქტორები:** *** სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ.** *** ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს.** *** სოციალური ფაქტორები:** *** პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს.** *** პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს.** *** ეკონომიკ**	**ზოგადი მიდგომა**
	პროფილი, რომელიც	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	მოცემულია მეხუთე თავში	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	არსებულ ცხრილში, აქ	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს ართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	კონკრეტულად უნდა იქნას	

პრობლემის არსებობისას, ადამიანმა უნდა იფიქროს იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მასზე ნივთიერება და რა გავლენას ახდენს მის ცხოვრებაზე.	ოგორც ზემოთ აღნიშნა, ამოღების პროცესი ხშირად რთული და გართულებულია შემდეგი მიზეზებით: * ფსიქოლოგიური ფაქტორები: * დამოკიდებულება: ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული ფიზიკური და ემოციური სიმპტომები. * სტრესი და შფოთვა: ამოღების პროცესთან დაკავშირებული შიშები და უიმედობა. * დეპრესია: ამოღების დროს გამოწვეული განწყობილების გაუარესება. * ფიზიოლოგიური ფაქტორები: * სიმპტომატიკა: მოხსნისას წარმოქმნილი უსიამოვნო გრძნობები, როგორიცაა ტკივილი, ღებინება, ოფლის მომატება და ა.შ. * ფიზიკური მდგომარეობა: არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც ამოღების პროცესს გართულებს. * სოციალური ფაქტორები: * პროფესიული ვალდებულებები: სამსახურში დაბრუნება ან სხვა პასუხისმგებელი მოვალეობების შესრულება ამოღების დროს. * პარტნიორის მხარდაჭერა: ოჯახის წევრების ან მეგობრების არარსებობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ამოღების პროცესს. * ეკონომიკ	ზოგადი მიდგომა
	გათვალისწინებული).	

ფარმაცევტიკის ოპიოიდების შემცვლელი: გაბაპენტინი და პრეგაბალინი.

გაბაპენტინი და პრეგაბალინი ხშირად გამოიყენება კონკრეტულად იმის თავიდან ასაცილებლად, რომ ოპიოიდები იყოს დაწერილი, ან ოპიოიდების დოზის ეტაპობრივი შემცირებისთვის, ნერვული ტკივილის კომპონენტის მოსახელებლად. ეს შეიძლება იყოს ლეგიტიმური და სასარგებლო ინსტრუმენტი. თუმცა, თუ არავინ აკრიფობს ვადიანობას, ესეც შეიძლება გახდეს ანგარიშვალდებულების გარეშე, უსასრულო რეცეპტი.

⚠ გაფრთხილება

Recovery Kernel-ის საკუთარი მასალა გაბაპენტოიდებზე აქცენტირებულია და ის პირდაპირ ამ კონტექსტს ეხება: ეს პრეპარატები დღეზე უფრო ხშირად აღიქმება, როგორც ისეთი, რომელთაც თან ახლავს რეალური დამოკიდებისა და მოწოვნის რისკი, მათ შორის გულისრევის რისკი მაღალ დოზებში, როდესაც მკურნეობა უეცრად წყდება, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად ისინი ინიშნებოდა ისე, თითქოს არ ქონათ რისკები. თუ გაბაპენტინი ან პრეგაბალინი предложена როგორც ოპიოიდების ალტერნატივა, მაშინ ამ ბიბლიოთეკის "სუბსტიტუციის მედიკამენტების" განყოფილებაში მოცემული იგივე საკითხები უნდა იქნეს გათვალისწინებული: არის თუ არა განსაზღვრული დასრულების თარიღი ან შეფასების ეტაპი, არის ეს დროებითი ხიდი თუ გრძელვადიანი მკურნეობა და როგორ გამოიყურება ამ კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებული მოწოვნის პროცესი, თუ მისი გაწყვეტა საჭიროა. პრეპარატი, რომელმაც თავიდან აუქცირება შეაფერხა ერთ-ერთი დამოკიდებულება. რისკი ავტომატურად არ არის დამოკიდებულებისგან თავისუფალი.

ძირითადი მიზეზის მოგვარება, მხოლოდ დოზის შემცირების ნაცვლად.

მეექვსე ნაწილში აღნიშნული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რომელთა ოპიოიდების გამოყენება რეალურ ტკივილზე დაიწყო, საჭიროებს დოზის შემცირებას, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. მეხუთე და მეექვსე ნაწილებში აღნიშნულია, რომ კონტროლირებული ტკივილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გზა, რომელიც ხელახლა ოპიოიდების გამოყენებაზე მიგვყავს. ტკივილის რეალური მიზეზის გაკითხვა და მისი პირდაპირი მკურნალობა არ არის მხოლოდ სასურველი, არამედ აუცილებელი ნაწილი დოზის შემცირების წარმატებისთვის.

- მომატებული ტკივილის წყაროს შეფასება – იმიჯინგი, სპეციალისტთან კონსულტაცია ან სხვა დიაგნოსტიკური ნაბიჯი, რომელიც ჯერ არ არის განხორციელებული – ვიდრე მხოლოდ სიმპტომების უწყვეტი მკურნალობა.
- ფიზიკური თერაპია და არა-ოპიოიდული ფარმაკოლოგიური ტკივილის მმართველობა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტკივილს სპეციალიზებული ექიმი, პარალელურად შემცირების გეგმასთან.
- კეტამინის ინფუზიური თერაპია არის რეალური და დამტკიცებული მეთოდი გარკვეული ქრონიკული ტკივილის მდგომარეობების სამკურნალოდ (კომპლექსური რეგიონალური ტკივილი, ფიბრომიალიგია და ნევროპათიის ზოგიერთი ფორმა). ეს ინფუზია ხორციელდება ანესთეზიურ დოზებში კონტროლირებად კლინიკურ გარემოში და განსხვავდება იმ

შემთხვევებისგან, როდესაც კეტამინი გამოიყენება მკურნალობის შეწყვეტის მხარდაჭერისთვის, რაც მოხსენიებულია ამ სერიაში სხვა ნაწილებში. მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ტკივილმკლებ სპეციალისტთან კონსულტაცია გაიწროთ, თუ სტანდარტული, ოპიოიდების გარეშე მკურნალობა არ არის საკმარისი.

 თავშესაფარი

თუ არავის უმსჯელა, რატომ არის ტკივილი და მხოლოდ ტკივილს მკურნალობდნენ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ აუხდეთ ექიმს. მედიკამენტის შემცირება, რომელიც იმართვებოდა გამოუვლენელი პრობლემის შემთხვევაში, გარეშე იმისა, რომ ეცადოთ გაიგოთ, რა არის რეალური პრობლემა, სწორედ ის სიტუაციაა, რომლისგანაც ეს ინიგება ცდილობს დაგეხმაროთ თავის ასარიდებლად.

მ seventh განყოფილება — გამოიყენეთ პატერნის კლასიფიკაცია.

Level	პატერნი	რისკი	ძვლის სისტემის ჯანმრთელობა.
1 — დაინიშნა, ხანმოკლე ვადით, გართულებები ს გარეშე.	სამართლებრივი რეცეპტი, რომელიც გამოიყენება ინსტრუქციის მიხედვით და შეზღუდული დროის განმავლობაში.	ფიზიკური დამოკიდებულებ ა შეიძლება განვითარდეს 1-2 კვირაში, რეგულარული გამოყენების შემთხვევაშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის აუცილებლად გამოწვეული ბოროტად გამოყენებით.	დაგეგმვეთ მედიკამენტების დოზის თანმიმდევრული შემცირება ექიმთან ერთად, ვიდრე მკვებრიობის უეცარი შეწყვეტა, რაც კვლავაც უფრო ασφαλής გზაა, მიუხედავად ამ დონისა.
2 — დაინიშნა, გრძელვადიანი ან მსუბუქი გაძლიერება.	წარმოების მოხმარება განსაზღვრული დოზით და ვადით, ან დოზის თანდათანობითი გაზრდა იმავე ეფექტის შენარჩუნებისთვის.	მცირე - სავარაუდოდ, ფიზიკური დამოკიდებულებ ა უკვე ჩამოაყალიბებუ ლია.	დამკვირვებადი დოზის შემცირება მნიშვნელოვანია აქ; მოულარმა შეწყვეტამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი სიმპტომები, და ეს არის ის ჯგუფი, სადაც მედიკამენტოზური მკურნალობის (MAT) შესახებ საუბარი, თუნდაც ხანმოკლე ვადით, ღირს წინასწარ.

Level	პატერნი	რისკი	ძვლის სისტემის ჯანმრთელობა.
3 — რეგულარული, ექიმისგან არ დაწერილი რეცეპტით ან მნიშვნელოვნად გაზრდილი დოზით გამოყენება.	დადგენილი დოზის მიღმა, სხვა პირის მედიკამენტების გამოყენება ან რეგულარული, ყოველდღიური, 24 საათიანი რეჟიმის გარეშე ნარკოტიკების მოხმარება.	მაღალი.	ექიმთან კონსულტაცია მკვეთრია ნებისმიერმა შეწყვეტის მცელობამდე. ფარმაკოთერაპია (MAT) უნდა იყოს ამ საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი, არა მხოლოდ უკანასკნელი გზა.
4 - დამოკიდებულობა, ყოველდღიური გამოყენება, მათ შორის სიმპტომების მოსახვრეტად.	ოველდღიური ან თითქმის ყოველდღიური გამოყენება, მათ შორის, კონკრეტულად იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მოწოვნის სიმპტომები, ვიდრე ეფექტისთვის.	მძიმე შემთხვევები - ეს არის ის ჯგუფი, რომლისთვისაც Section 8-ის ოპიოიდული მედიკამენტების მკურნალობისა და დეტოქსიკაციის პროტოკოლია შექმნილი.	არ ცდილოთ დამოუკიდებლად მკურნალობის შეწყვეტა. 0-ე მუხლის მიერ მოწოდებული რელიapse-ის/გადამკვეთვის გაფრთხილება მთლიანად ვრცელდება ამ კონკრეტულ ჯგუფზე.

მეთვრამეული მუხლი — სამკურნალო საშუალებების გამოყენებითი მკურნალობა და დეტოქსიკაცია.

მედიკამენტები	მექანიზმი	კლინიკური შენიშვნები.
ბუფრენორფინი (Suboxone, Subutex, Sublocade)	ნაწილობრივი ოპიოიდული აგონისტი — აქტივირებს რეცეპტორს საკმარისად, იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწოვნა და წყევრება, მაგრამ აქვს ზედა ზღვარი, რომელიც შეზღუვავს ჭარბი დოზით მომატებულ ობას, რაც ხშირად გვხვდება სრულ აგონისტებში.	პაციენტმა უნდა განიცდოს მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის მოწოვნის სინდრომი, სანამ მიიღებს პირველ დოზას (სადარბოლოს მოწოვნის თავიდან ასაცილებლად). მას შეიძლება დაინიშნოს კლინიკურ პირობებში, სპეციალურად მომზადებული ექიმების მიერ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ხელმისაწვდომობას, შედარებით მეთადონის კლინიკურ მოდელთან.
მეთადონი.	მსხვილფოვანი ოპიოიდი, გრძელმოქმედების მატარებელი — სტაბილიზაციას უზრუნველყოფს რეცეპტორულ აქტივობას, თავიდან აცილების გარეშე, რაც ხშირად გვხვდება	უმეტეს შემთხვევაში, საჭიროა ყოველდღიური მიღება ლიცენზიის მქონე ოპიოიდული მკურნალობის პროგრამაში, განსაკუთრებით თავდაპირველ ეტაპზე. არსებობს ძლიერი სამეცნიერო საფუძველი,

მედიკამენტები	მექანიზმი	კლინიკური შენიშვნები.
	მოკლე მოქმედების მქონე ოპიოიდებთან.	განსაკუთრებით მაღალი სიმძიმის ან ხანგრძლივი დამოკიდებულების შემთხვევაში. CYP3A4-ის მდგომარეობა (5-ე მუხლი) მოქმედებს დოზირებაზე.
ნალტრექსონი (ორალური ან შენელებული გამოყოფის ფორმით, Vivitrol).	ოპიოიდული რეცეპტორის ანტაგონისტი — აბლოკავს რეცეპტორს მთლიანად, მისი აქტივაციის ნაცვლად, რაც არ იწვევს ოპიოიდულ ეფექტს და ბლოკავს ნებისმიერი ოპიოიდული საშუალების მოქმედებას, რომელიც მასთან ერთად გამოიყენება.	საჭიროა სრული დეტოქსიკაცია (როგორც წესი, 7-10 დღე ოპიოიდების გარეშე), რადგან ამის გაკეთება, თუ ოპიოიდები ჯერ კიდევ ორგანიზმშია, გამოიწვევს მძიმე მოწოვნის სინდრომის. OPRM1 გენის G-ალელის მატარებლებმა (5-ე განყოფილებაში) აჩვენებენ შესაბამისი რეაქციას და ეს არის მნიშვნელოვანი, პრაქტიკული ინფორმაცია მკურნალობის არჩევისთვის.

THE CENTURION

MAT-ის არჩევა არის მნიშვნელოვანი კლინიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც პირდაპირი სარგებელი ხვდება გენეტიკურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია მეხუთ თავში. ეს ინფორმაცია აუცილებელია იმ პირისთვის, ვინც თქვენთან ერთად ამ საკითხს მართავს.

მეთვრამეტი მუხლი — აღდგენის პროტოკოლი

პირველი საფეხური — ბიოლოგიური საფუძველი (დაწყებული პირველ დღეს).

დამხარება	როლი
DLPA (DL-ფენილალანინი)	ენდორფინების სისტემის წინასწარმომზადების მხარდაჭერა — დაიწყეთ პირველი დღე, თუ ჭამთ.
NAC (600 მგ დღეში ორჯერ).	გლუტამატის ჰომეოსტაზი და მსურველობის შემცირება.
5-MTHF	ძირითადი მეთილაციისა და ნეიროტრანსმიტერების სინთეზის მხარდაჭერა.
მაგნეზიუმის გლიცინატი.	ზოგადი ნერვული სისტემის მხარდაჭერა და ძილი.
ომეგა-3 (EPA-მსარგებელი).	ზოგადი ნევროლოგიური υποστήριξη მნიშვნელოვანი სისტემის აღდგენის პერიოდში.

II დონე - სამედიცინო

- MAT (მედიკამენტოზური მკურნალობა) უნდა იყოს მთავარი სამედიცინო ჩარევა პროგრამის 8-ე ნაწილში, არამედ დამატებითი საშუალება.

- ტკივილის მართვის პროგრამა (მე-6 განყოფილება) უნდა მიმდინარეობდეს პარალელურად, თუ ქრონიკული ტკივილია აღნიშნული. ეს არ არის ნებადართული ამ მოსახლეობისთვის.
- სისხლის ინფექციური დაავადებების ტესტირება და მკურნალობა, თუ არსებობს ინექციების გამოყენების ისტორია (VI მუხლი).

ეკონომიური და პრაქტიკული ინსტრუმენტი: დოზირების კონტროლი დროის მიხედვით.

მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ აღინიშნოს, რადგან ეს არის იაფი, ნამდვილად სასარგებლო და ხშირად არ მოიხსენიება გამოჯანსაღების მასალებში: არსებობს დროზე კონტროლირებადი მედიკამენტების საცავი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია ისეთ შემთხვევებისთვის, როდესაც მიზანი არის კონტროლირებული, დაგეგმილად წვდომა, ვიდრე სრული, თავისუფალი წვდომა ან საერთოდ წვდომის არარსებობა. სანდო პირი - პარტნიორი, ოჯახის წევრი ან სხვა ზედამხედველი - აბსოლუტურად ზუსტ დოზებს აყენებს, რომელიც დაგეგმილია ექიმთან შეთანხმებით, ხოლო მოწყობილობა ფიზიკურად არ იხსნება, სანამ დაგეგმილ დროზე არ მიუვიდეს, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεται ადამიანი, რომელიც მედიკამენტს იღებს. ეს პირდაპირ განიხილავს იმავეს წვდომის და შეზღუდვის მექანიზმს, რაც სხვაგანაც არის აღნიშნული. ეს ბიბლიოთეკის გაუქმების სერია: იმპულსური სურვილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობის აღმოფხვრა, რომელიც ეხება დოზის ადრეულ ან დამატებით მიღებას, თავისთავად არის რეალური, ფიზიკური ფორმის მხარდაჭერა, არა მხოლოდ სიმბოლური.

⚠ გაფრთხილება

სტანდარტული გაფრთხილებები ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია: ეს არის დამხმარე ინსტრუმენტი, რომელიც არ არის სამედიცინო დეტოქსიკაციის გეგმის ან ექიმის ზედამხედველობის შემცვლელი, სადაც ისინი საჭიროა. მას სჭირდება ნამდვილად სანდო და ყოველთვის ხელმისაწვდომი პირი – ინსტრუმენტი არ მუშაობს, თუ ის ადამიანი, ვინც მას იყენებს, არ არის საიმედო, და ის შეიძლება გახდეს კონფლიქტისა ან უკმაყოფილების წყარო, თუ იგი შემოთავაზდება გულწრფელ საუბარს გარეშე იმის შესახებ, რატომ. ის არ აძლევს ადამიანს საშუალებას, მიიღოს მედიკამენტები ან ნივთიერებები მთლიანად მოწყობილობის გარეთ, ამიტომ ის ეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რისკს (ტემპის ადრეული, იმპულსური შეცვლა შემცირების მედიკამენტში), ვიდრე მთლიანი სურათი. უმეტეს მოდელს აქვს გადაუდებელი სიტუაციებისგან დასაცავად განკუთვნილი ფუნქცია – გაითვითრეთ, რა არის ეს ფუნქცია და ვინ აკონტროლებს მას, სანამ მოწყობილობაზე დამოკიდეтесь. ეს არასოდროს უნდა იყოს ერთადერთი უსაფრთხოების ღონისძიება იმ პირებისთვის, რომლებიც უფრო მაღალი რისკის ჯგუფში □□□□ (იხ. მე-7 მუხლი) – ეს არის პრაქტიკული დახმარება, რომელიც συμπληρώνει სამედიცინო მომსახურებას, ის კი არ არის მისი შემცვლელი.

უკანონო წარმოშობის ნივთიერებების შესახებ: რატომ არის "უბრალოდ გადარჩება, სანამ დოზის შემცირება არ დასრულდება" საკუთარი სახის საფრთხე.

ეს მოითხოვს პირდაპირი და სერიოზული მიდგომას, ვიდრე ზემოქმედების მცირე აღნიშვნა, რადგან რისკი კატეგორიულად განსხვავდება სხვა ყველაფრისგან ამ გა□□ში. ფარმაცევტული კომპანიის ლიცენზიით გამოშვებული სამკურნალო პრეპარატი გადის დოკუმენტირებული წარმოშობის ეტაპებს: იგი იწარმოება რეგულირებულ პირობებში, მისი დოზა და შემადგენლობა არის გადამთარგმნილი, ის თვალყურს ადევნებს ყველა ეტაპს წარმოებისგან დამწყებად და ბოლოვდება ხელში არსებული ფლაკონით. სისტემის გარეშე მიღებული ნივთიერება არ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს. არ არსებობს დოკუმენტაცია, წარმოშობის სერთიფიკატი, შემადგენლის გადამოწმება, ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გზით გადის ან რას უმატებენ მას მომხმარებელს მისაღებამდე. ეს არ არის მორალური შეფასება არ უნდა იყოს დაკავშირებული იმის არჩევანთან, თუ ვინ რატომ მიმართა ამ ს□□ს; მნიშვნელოვანია მხოლოდ ობიექტური ფაქტი, რომელიც მას უკავშირდება, და ეს ფაქტი არის ისეთი, რაც არ იცვლება იმის გამო, ვინ მიმართა მას.

□ სამედიცინო ექსტრემალური სიტუაცია

ეს არ არის აბსტრაქტული რისკი. მეექვსე მუხლის მიხედვით, ამჟამინდელი უკანონო ოვოიდების ჯგუფი – და, უფრო ზოგადად, უკანონო და ყალბი პრეპარატების ჯგუფიც – ხშირად არის დაბინძურებული ფენტანილით, რომელიც საკმარისად ძლიერია წონის მიხედვით, რომლის საზიანო დოზაც შეიძლება იყოს موجود გარეშე რაიმე თვალსაჩინო, გემრიელობის ან გამოვლენილი სხვაობის გარეშე, ვიდრე არადაბინძურებულ ვერსიას. ადამიანი, რომელიც "გვირგვინის" ხარვეულების გადაკვეთას ცდილობს ან ტკივილგამომ alleviating საშუალებებს იყენებს სამედიცინო დაწესებულებების გარეშე, ხელმისაწვდომი ნივთიერებები იღებს, რაც განსხვავდება ზედამხედველობით მედიკაციის გაგრძელებიდან. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ფენტანილის მოხმარებისას არსებობს რისკი, რომ არ იცით, რა კონკრეტულად მიიღებთ. ფენტანილის ტესტ-სტრები და ნალოქსონი (0-ე მუხლი, 6-ე მუხლი) ამ რისკის შემცირებას უწყობს ხელს, მაგრამ მას სრულად არ აღმოფხვავს. ერთადერთი გზა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ამ რისკის სრული თავიდან აცილება, არის იმისგან თხოვნა, რომ არ გამოიყენოთ არავერფიკატური წყარო. სწორედ ამიტომ არსებობს მედიცინის და MAT (მედიკამენტოზური მკურნალობის) გზები (8-ე მუხლი), რომლებიც რეკომენდებულია დოზის თანდათანობითი შემცირებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზებზე წვდომა ხშირად არის პრობლემური.

მესამე საფეხური — ნერვული სისტემა და ენდორფინების არქიტექტურა (1-დან 12 თვემდე, მთავარი ფაზა).

- □ოველდღიური, ინტენსიური ვარჯიში – მთავარი ფაქტორი, რომელიც ɛndorphinების გამოყოფას აძლიერებს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ყველა oბიყში ამ სერიაში.

- მყარი საზოგადოებრივი კავშირები და ურთიერთობა – ეს არ არის შემთხვევითი, არამედ სისტემური, იმის გათვალისწინებით, რომ ოპიოიდული რეცეპტორების სისტემა პირდაპირ ახდენს გავლენას სოციალურ კავშირებსა და სასიამოვნებებზე (5-ე მუხლი).
- ცივი ტემპერატურა, სიცილი და მუსიკა – თითოეული მათგანი იწვევს ენდორფინების გამოყოფას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეფექტები შეიძლება იყოს ნაკლები, მაგრამ მათი კომბინაცია სასარგებლოა.

□ სანკტუარი

ენდორფინების არქიტექტურა თვარდება თანმიმდევრულ, ყოველდღიურ ვარჯიშს რამდენიმე თვის განმავლობაში, არა ეპიზოდური ძალისხმევით. ეს არ არის კრიტიკა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გაუჭირდა მისი შენარჩუნება – ეს არის რეალური ის ფორმა, რომელსაც ეს აღდგენა მოითხოვს, რაც შეესაბამება მესამე ნაწილში მოცემულ დროის გრაფიკს.

ახალი ნივთიერება: ოსიტოცინი და ჰიპოთალამო-ჰიფისური-ადრენალური სისტემის (HPA) აღდგენა.

ეს განყოფილება არსებობს იმიტომ, რომ თქვენი მთავარი სახელმძღვანელო მთლიან თავს უთმობს მას და ეს იმსახურებს გულწრფელ, სწორად აღნიშნულ ადგილს აქ, ვიდრე იყოს გამოტოვებული. ის მექანიზმი, რომელსაც ის ეხება, რეალურია და უკვე დასახელებულია ამ გა □□□□ ში: □□□□□□□ები ათრევენ HPA სისტემას იმ დრომდე, სანამ ისინი გამოიყენება, და როდესაც ისინი მოიხსნება, ეს ჩაწეული სისტემა არ επιστρέφει ნაზად ძირფუძველურ მდგომარეობაში - ის ამოიხტა, ხშირად მნიშვნელოვნად გადამეტებული. კორტიზოლი გადინდება ხდება, ამიგდალა ცხელდება და ნერვული სისტემა აცხადებს არსებობრივ კრიზისს, რომელიც არ აქვს გარე მიზეზს. ეს არის ფიზიოლოგიური მიზეზი, რის გამოც □□□□□□□ების მოხსნა შეიძლება გრძნობდეს სიკვდილს, მაშინაც კი, როდესაც... როდესაც ეს არ არის მედიკალურად საშიში (0-ე განყოფილება), "გრძნობილი" შეგრძნება არის ზუსტი აღწერა ნამდვილად გადატვირთული სტრესის სისტემის შესახებ, რაც არ არის ირაციონალური რეაქცია.

⚠ გაფრთხილება

ოქსიტოცინი არის კორტიზოლის გამოყოფის კaskადის პირდაპირი ანტაგონիսტი – ის აჩქარებს HPA სისტემას და ფუნქციონირებს როგორც "გამორთვის" ღილაკი იმ საგანმგებლოსთვის, რომელსაც ოპოიდები ჩუმად ინახავდნენ. თქვენი წყარო პირდაპირია და ღირს მისი განმეორება იმავე წინამდეგობებით: ეს პროტოკოლი ექსპერიმენტალურია და არ არის FDA-ის მიერ დამტკიცებული ნარკოტიკების მკურნალობისთვის, და ამჟამად გამოიყენება მხოლოდ რამდენიმე წინდახედულ კლინიკასა და ინფორმირებულ ადამიანს, რომლებიც მუშაობენ აღდგენის მეცნიერების საზღვრებზე. მას უნდა ეკუთვნოდეს ამ სახელმძღვანელს როგორც დოკუმენტირებული, რეალური მექანიზმი, რომლის არსებობის შესახებ ღირებულია ცოდნა – არა როგორც თვითონ განხორციელებული ინტერვენცია. ვინც მას ითვლის, მან ეს გააკეთოს ფსიქიატრთან ერთად. დამოკიდებულების მედიცინის სპეციალისტი

აქტიურად არის ჩართული, ისევე როგორც ეს სერიისთვის ყოველ სხვა ახალი, "Emerging" კატეგორიაში შექმნილი ელემენტისთვის იყო დამახასიათებელი.

პრაქტიკულად, ეს არის იგივე კატეგორიის დანამატი, რაც ინტრანაზალური ოქსიტოცინის მასალას, რომელიც უკვე აღწერილია Recovery Kernel-ის დოკუმენტაციაში ბენზოდიაზეპინების მოხსნის შესახებ. მექანიზმი (HPA-აქსის დამშრობი) იგივეა და შესაბამისი предостережениец: რეალური, ღირებულია სპეციალისტთან კონსულტაცია, ჯერ არ არის სტანდარტული მკურნალობის საშუალება.

მეთხუთმე მეწყეული — სასწრაფო სიტუაციების აღიარება, განმეორებით.

სამედიცინო ექსტრემალური სიტუაცია

დარეკეთ 112 და გამოიყენეთ ნალოქსონი, თუ ის ხელმისაწვდომია, შემდეგი სიმპტომების შემთხვევაში: შენელებული, ზედაპირული ან შეჩერებული სუნთქვა; ლურჯი ან ნაცრისფერი ტუჩები ან თითები; რეაქციის არარსებობა; ხრიალის ან ჩoking-ის ხმauri. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პერიოდის შემდეგ, როდესაც ოპიოიდების გამოყენება შეწყვიტეს ან შემცირდა, იმის გამო, რომ ორგანიზმის ტოლერანტულობა იკარგება (იხ. 0-ე მუხლი), და ფენტანილის შესაძლო არსებობის (6-ე მუხლი) გამო, რაც ნებისმიერ არალეგალურ წყაროდან მომდინარე ოპიოიდთან დაკავშირებული დამატებით, გაუთვალისწინებელ რისკს წარმოადგენს.

მეთვრამეტე თავი — სრული პროტოკოლის კროს-რეფერენსების მონიშვნა.

მითითებულია.	ისი გათვალისწინებაა საჭირო?
Recovery Kernel ოპიოიდების სახელმძღვანელო, მესამე ნაწილი.	ეს სახელმძღვანელოს მეფროსი მერვე ნაწილი მოიცავს კომპლექტურ მედიკამენტოზურ მკურნალობას (MAT) და დეტოქსიკაციის სრულ ჩარჩევს.
Recovery Kernel ფენტანილის სახელმძღვანელო.	ზოგიერთი დეტალი კონტამინაციის შესახებ, რომელიც ეხება მეექვსე მუხლს: ტესტირების ზოლები, ნალოქსონის ხელმისაწვდომობა და ფენტანილის განსხვავებული ფარმაკოკინეტიკა სხვა ოპიოიდებთან შედარებით.
Recovery Kernel ყური, თვალი და კბილების სახელმძღვანელო, მეხუთი თავი.	ინექციებთან დაკავშირებული ინფექციის რისკების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია მეექვსე მუხლში.
პროტოკოლი №14 (გამომშლელი ტკივილის მენეჯმენტი).	მკურნალობის პარალელური გზა, რომელიც მოხსენიებულია მეექვსე თავში, განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომელთა ოპიოიდების გამოყენება დაიწყო კანონიერი ტკივილგამომ alleviating მკურნალობით.
კომპენდიუმის პროტოქოლი 05	ამ კონკრეტული აღდგენისთვის უმაღლესი

მითითებულია.	□ისი გათვალისწინებაა საჭირო?
(საზოგადოებრივი სივრცის რემონტი).	პრიორიტეტი: სტიმულზე დაფუძნებული წყევლის გამოჩენა არის მთავარი ხელახალი გამოყენების მიზეზი ოპიოიდების აღდგენის პროცესში, უფრო ხშირად, ვიდრე სხვა ნივთიერებებთან დაკავშირებით.
გენეტიკური ნივთიერებების მატრიცა, □□□□□□□□ A.	გენეტიკური მუტაციებს შორის პირდაპირი კავშირი, რომელიც აღწერილია მეხუთი ნაწილში: GABRA2 + COMT Met/Met ('ტრემული დეპრესიის მოდელი') შეესაბამება P06, P09, P10, P21-ს; მხოლოდ GABRA2 შეესაბამება P01, P06, P20-ს; GABRA2 + MTHFR (' depleted-impulsive pattern') შეესაბამება P06, P07, P11, P21-ს. თუ ხელმისაწვდომია სრული გენომური ანალიზი, მიმართეთ ამ დანართს.
Recovery Kernel-ის მთავარი წიგნი, მე-8 თავი (ოქსიტოცინის პროტოკოლი).	მეცხრე მუხლის ახალი დამატების სრული თავი – დეტალური ინფორმაცია მექანიზმზე და იმავე საექსპერიმენტო გამოყენების შემაჩერებელ პუნქტებზე, რომლებიც ამ სახელმძღვანელს მოიცავს.
Compendium Protocoli 20, 21, C-28 (იდენტიტეტის არქიტექტურა)	1-6 თვეს შორის, პირველადი ეტაპზე, მნიშვნელოვანია იდენტობის ხელახლა შექმნა, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება წარსული ნარკოტიკების გამოყენების ისტორიისგან.
Recovery Kernel: ტრავმა და ნარკოტიკების კავშირი.	ოპიოიდების გამოყენებასთან დაკავშირებული დამოკიდებულება ხშირად იწყება მძიმე, ტრავმული პირობებში; ტრავმის სპეციფიკური სამუშაო არ უნდა დაიწყოს, სანამ არ დამყარდება ბიოლოგიური სტაბილურობა და არ არის განხორციელებული მოხმარების შემცირების (MAT) თერაპია. დრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია აქ, ისევე როგორც მთლიანად ამ სერიაში.

მეთვრამეტე მუხლი — დასკვნა

□ თავშესაფარი

ოპიოიდებისგან გამოჯანმრთელება არის ერთ-ერთი იმ რამოდენიმე სფეროს შორის ნარკომანიის მედიცინაში, რომელსაც აქვს მკაფიო და კარგად დამყარებული სამეცნიერო საფუძველი. MAT (მედიკამენტოზური მკურნალობა) სიცოცხლეს იხსნის, არაერთხელ და შესამჩნევად. მისი გამოყენება არ არის გამოჯანმრთელების ნაკლებფასეული ფორმა. ოპიოიდებმა რომელმაც შეინახა ენდორფინის და რეცეპტორული სისტემები, ისინი შესაძლებელია აღდგეს, რეალურ დროში, ανεξάρτητα από το αν η αποκατάσταση περιλαμβάνει συνεχή φαρμακευτική αγωγή. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუხლი 0-ის მიხედვით, გადარჩება ის პერიოდი, როდესაც ტოლერანტულობა და მოლოდინი არ ემთხვევა ერთმანეთს. ამ გზამრავში ყველა სხვა რჩევა ხელმისაწვდომია, რომ თქვენ უსაფრთხოდ გაივროთ ეს ეტაპი.

გაიდის დასრულება — ოპიოიდების მიღების შეწყვეტის პროტოკოლი.

ზარბადობის შემცირების რესურსი — არ არის სამედიცინო რჩევა — არ არის სასწრაფო დახმარების ნაცვლად.

Crisis Resources: 988 (Suicide & Crisis Lifeline, call or text) | SAMHSA: 1-800-662-4357